


Des idées, des réflexes

Comment lire les coordonnées d'un vecteur ?

Dans le repère ci-contre, pour aller du point A au point B :

- on se déplace horizontalement de 3 unités vers la droite ;
- puis on se déplace verticalement de 4 unités vers le bas.

Les coordonnées du vecteur \vec{AB} sont $(3; -4)$.




Comment additionner des vecteurs ?

Le triangle ACF est équilatéral et contient quatre triangles équilatéraux.

Pour calculer la somme $\vec{FC} + \vec{ED}$:

- on cherche un vecteur égal au vecteur \vec{ED} **d'origine C** :
- $BCED$ est un parallélogramme (et même un losange) donc $\vec{ED} = \vec{CB}$;
- on utilise la relation de Chasles : $\vec{FC} + \vec{ED} = \vec{FC} + \vec{CB} = \vec{FB}$.




Comment construire le produit d'un vecteur par un nombre réel ?

- Pour construire le représentant d'origine A du vecteur $2\vec{u}$:

- on trace la droite de direction \vec{u} qui passe par A ;
- on place le point B de cette droite en reportant, à partir de A, deux fois la longueur du vecteur \vec{u} , dans le sens du vecteur \vec{u} .

- Pour construire le représentant d'origine C du vecteur $-3\vec{u}$:

- on trace la droite de direction \vec{u} qui passe par C ;
- on place le point D de cette droite en reportant, à partir de C, trois fois la longueur du vecteur \vec{u} , dans le sens contraire du vecteur \vec{u} .



Comment démontrer que des vecteurs sont colinéaires ?

- Dans un repère, deux vecteurs $\vec{u}(a; b)$ et $\vec{v}(a'; b')$ sont colinéaires si, et seulement si, $ab' - a'b = 0$.

Étude de la colinéarité des vecteurs $\vec{u}(3; 9)$ et $\vec{v}(-2; -6)$:

$$ab' - a'b = 3 \times (-6) - (-2) \times 9 = -18 + 18 = 0 \text{ donc les vecteurs } \vec{u} \text{ et } \vec{v} \text{ sont colinéaires.}$$


Série 1

1 Le vecteur de la translation qui à un point A associe un point B est ...

- a. \overrightarrow{AB} b. \overrightarrow{BA} c. \overrightarrow{AB} d. \overrightarrow{BA}


2 EFGH est un parallélogramme. Le point H a pour image le point E par la translation qui ...

- a. au point F associe le point G
 b. au point F associe le point E
 c. au point G associe le point F




3 Cette figure est un assemblage de losanges. L'image du point K par la translation de vecteur \overrightarrow{CE} est le point ...

- a. A b. F c. G d. I



4 ABCDEF est un hexagone régulier de centre O. On peut dire que les vecteurs \overrightarrow{CF} et \overrightarrow{FO} ont ...

- a. même direction
 b. même norme
 c. même sens



5 ABCD est un carré. Un vecteur ayant le même sens et la même norme que le vecteur \overrightarrow{AB} est ...

- a. le vecteur \overrightarrow{AD} b. le vecteur \overrightarrow{BC}
 c. le vecteur \overrightarrow{CD} d. le vecteur \overrightarrow{DC}

Série 2

1 ABCD est un parallélogramme.

On peut affirmer ...


- a. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ b. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$
 c. $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{CB}$ d. $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD}$

2 Sur la figure de la question 3 de la série 1. Un vecteur égal au vecteur \overrightarrow{IL} est ...

- a. le vecteur \overrightarrow{HD} b. le vecteur \overrightarrow{EH}
 c. le vecteur \overrightarrow{HE} d. le vecteur \overrightarrow{IC}


3 Dans la figure ci-contre, un représentant du vecteur \vec{u} est ...

- a. le vecteur \overrightarrow{CG}
 b. le vecteur \overrightarrow{FE}
 c. le vecteur \overrightarrow{HD}




4 Dans cette figure, l'image du point A par la translation de vecteur \overrightarrow{FC} suivie de la translation de vecteur \overrightarrow{DB} est ...

- a. le point D b. le point B c. le point E



5 Ci-contre, l'image du point A par la translation de vecteur \overrightarrow{DC} est le point E. De plus, ce point E a pour image le point F par la translation de vecteur \overrightarrow{AC} . Alors ...

- a. $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{ED}$ b. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CF}$ c. $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{FC}$ d. $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{CF}$




Série 3

1 L'affirmation vraie est ...

- a. si EFGH est un parallélogramme, alors $\overrightarrow{HE} = \overrightarrow{GF}$
 b. si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$, alors ABCD est un parallélogramme
 c. si LOUP est un parallélogramme, alors $\overrightarrow{OU} = \overrightarrow{PL}$


2 ABCD et BCEF sont des parallélogrammes. On a l'égalité des vecteurs ...

- a. \overrightarrow{AB} et \overrightarrow{EC}
 b. \overrightarrow{DE} et \overrightarrow{AF}
 c. \overrightarrow{EF} et \overrightarrow{AD}




3 ABDC est un parallélogramme et BDE est un triangle isocèle en D. Les points A, B, E sont alignés. Le point F est le milieu du segment [DE]. On peut en déduire ...

- a. $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{ED}$ b. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ c. $\overrightarrow{FD} = \overrightarrow{EF}$



4 ABCD est un parallélogramme de centre O. Si M est le symétrique du point A par rapport au point B et si N est l'image du point D par la translation de vecteur \overrightarrow{CD} , alors ...

- a. $\overrightarrow{MA} = \overrightarrow{AB}$ b. $\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{DB}$ c. $\overrightarrow{ND} = \overrightarrow{BM}$



5 ABCD est un parallélogramme de centre O. Les points I, J, K et L sont les milieux des segments [AB], [BC], [CD] et [AD] respectivement. Alors ...


- a. $\overrightarrow{IJ} = \overrightarrow{LK}$ b. $\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{KL}$ c. $\overrightarrow{KJ} = \overrightarrow{IL}$

Série 1

1 Le plan est muni d'un repère orthonormé.

L'abscisse du point A est ...

- a. -1
- b. 2
- c. -2
- d. -3




2 Dans le repère de la question 1, l'ordonnée du point B est ...

- a. -5
- b. -2
- c. 2
- d. 3


3 Dans un repère orthonormé, on donne les points A(2 ; -1), B(3 ; -1), C(-2 ; -3) et D(2 ; -2). Katya a voulu placer ces quatre points, mais elle n'a placé correctement qu'un seul point ; c'est le point ...

- a. A
- b. B
- c. C
- d. D



4 Ci-contre, le plan est muni d'un repère (O ; I, J). On donne le point A. Les coordonnées du symétrique de A par rapport à O sont ...

- a. (2 ; 3)
- b. (-2 ; 3)
- c. (-2 ; -3)
- d. (-3 ; 2)




5 Dans le repère de la question 4, on donne les points B(-3 ; -2) et K(2 ; 1). Les coordonnées du point C symétrique de B par rapport à K sont ...

- a. (7 ; 4)
- b. (-8 ; -5)
- c. (4 ; 7)
- d. (-0,5 ; -0,5)

Série 2


1 Dans le repère (O ; I, J) ci-contre, le vecteur qui a pour coordonnées (-1 ; 2) est ...

- a. le vecteur \vec{AB}
- b. le vecteur \vec{JD}
- c. le vecteur \vec{BC}
- d. le vecteur \vec{EO}




2 Dans le repère (O ; I, J) ci-contre, les coordonnées du vecteur \vec{AB} sont ...

- a. (3 ; -5)
- b. (-3 ; 5)
- c. (3 ; -6)
- d. (-5 ; 3)



3 Dans le repère (O ; I, J) ci-contre, on a représenté quatre vecteurs, dont le vecteur de coordonnées (-2 ; 2). Il s'agit du vecteur ...

- a. \vec{t}
- b. \vec{u}
- c. \vec{v}
- d. \vec{w}



4 Dans un repère (O ; I, J), on donne les points A(-1 ; 2) et B(3 ; -1). Le vecteur \vec{AB} a pour coordonnées ...

- a. (2 ; -3)
- b. (2 ; 1)
- c. (4 ; -3)
- d. (-3 ; 4)


5 Dans un repère, on donne les points A(2 ; -2) et B(-2 ; 4). Le point C est le symétrique de A par rapport à B. Alors le vecteur \vec{BC} a pour coordonnées ...

- a. (4 ; -6)
- b. (0 ; 1)
- c. (-8 ; 12)
- d. (-4 ; 6)

Série 3

1 Dans un repère, on donne les points A(1 ; 2), B(-3 ; 4) et C(-1 ; 0). Le point D tel que $\vec{AB} = \vec{CD}$ a pour coordonnées ...

- a. (5 ; 2)
- b. (-5 ; 2)
- c. (3 ; -2)
- d. (-5 ; -2)



2 Dans un repère, on donne les vecteurs $\vec{MN}(1 ; -3)$ et $\vec{QP}(-1 ; 3)$. On peut affirmer que ...

- a. MNPQ est un parallélogramme
- b. MNQP est un parallélogramme
- c. PNMQ est un parallélogramme
- d. NPMQ est un parallélogramme

3 Dans un repère, on donne le point C(1 ; 2) et le vecteur $\vec{u}(-4 ; 1)$. Le point D image du point C par la translation de vecteur \vec{u} a pour coordonnées ...

- a. (-3 ; 3)
- b. (5 ; 1)
- c. (-5 ; -1)
- d. (3 ; -3)

4 Dans un repère d'origine le point O, on donne le vecteur $\vec{OH}(-1 ; 2)$. EFGH est un parallélogramme non aplati de centre O. Alors ...

- a. $\vec{OF}(-1 ; 2)$
- b. $\vec{HF}(-2 ; 4)$
- c. $\vec{OE}(1 ; -2)$
- d. $\vec{F}(1 ; -2)$


5 Dans un repère, on donne les points A(-3 ; 1), B(0 ; -4), C(8 ; -2) et D(5 ; 3). Alors on peut affirmer ...

- a. $\vec{AB} = \vec{DC}$ et ABCD est un parallélogramme
- b. $\vec{AB} = \vec{CD}$ et ABDC est un parallélogramme
- c. $\vec{AD} = \vec{CB}$ et DACB est un parallélogramme
- d. $\vec{BD} = \vec{AC}$ et ACDB est un parallélogramme

Série 1

1 Le plan est muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$. Par lecture graphique, le milieu M du segment [AB] a pour coordonnées ...

- a. (1; 1) b. (1; 2) c. (2; 1) d. (0,5; 1)



2 Le plan est muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$. On donne les points A(-6; 5) et B(2; 3). Le milieu I du segment [AB] a pour coordonnées ...

- a. (-4; 8) b. (-2; 1) c. (-4; 1) d. (-2; 4)

3 Le plan est muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$. On donne les points A(3; 4) et B(2; -3). Le milieu P du segment [AB] a pour coordonnées ...

- a. (0; 3) b. (5; 1) c. (0,5; 3,5) d. (2,5; 0,5)

4 Dans un repère, on donne les points A(-4; 3), B(0; -5) et C(4; -1). K est le milieu du segment [AB] et L celui du segment [AC]. Les coordonnées correctes sont ...

- a. K(-1; -1) b. L(0; 2) c. K(-2; -1) d. L(2; -3)

5 Le plan est muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$. On donne les points A(-3; 2), B(3; 4), C(5; 1) et D(-1; -1). On peut affirmer que les segments ...


- a. [AB] et [CD] ont le même milieu
 b. [AC] et [BD] ont le même milieu
 c. [BC] et [AD] ont le même milieu
 d. [OC] et [AD] ont le même milieu

Série 2

1 Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. On a tracé quatre vecteurs \vec{u} , \vec{v} , \vec{w} et \vec{t} .


Par lecture graphique, on peut affirmer que les vecteurs ...

- a. \vec{u} et \vec{v} ont la même norme
 b. \vec{u} et \vec{w} ont la même norme
 c. \vec{v} et \vec{w} ont la même norme
 d. \vec{t} et \vec{v} ont la même norme



2 Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. La norme du vecteur \overrightarrow{AB} est égale à ...

- a. -4 b. 3 c. 4 d. 5



3 Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$. La norme du vecteur \vec{u} de coordonnées $(-4; 0)$ est égale à ...

- a. 2 b. $\sqrt{2}$ c. 4 d. -4

4 Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on donne le vecteur $\vec{v}(2; \sqrt{5})$. La norme du vecteur \vec{v} est égale à ...

- a. $\sqrt{7}$ b. $2 + \sqrt{5}$ c. 3 d. 9

5 Dans un repère orthonormé, on donne les points C(7; -1), D(-6; -1) et le vecteur $\vec{u}(-12; 5)$. La norme du vecteur CD est égale ...

- a. à -13
 b. à la norme du vecteur \vec{u}
 c. à l'opposé de la norme du vecteur \vec{u}
 d. au triple de la norme du vecteur \vec{u}

Série 3

1 Dans un repère orthonormé, on donne les points M(2; 3) et N(1; 4). La distance MN est égale à ...


- a. 2 b. $\sqrt{2}$ c. 58 d. $\sqrt{58}$

2 Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on donne les points A(2; -2) et B(2; 0). On peut affirmer que ...

- a. OA = AB b. OA = 2AB
 c. OB = 2AB d. OB = AB

3 Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on donne le point A(-1; $\sqrt{3}$). Alors A appartient au cercle de centre O et de rayon ...

- a. 1 b. 2 c. 4 d. $\sqrt{2}$



4 Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on donne les points A(-3; 0) et B(0; 4). Le périmètre du triangle OAB est égal à ...

- a. 6
 b. 12
 c. $7 + \sqrt{7}$
 d. $1 + \sqrt{7}$

5 Dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$, on donne les points A(-2; 4), B(2; 0) et M(-6; -4). On a alors ...



- a. AB = BM
 b. AB = AM
 c. MA = MB
 d. MA = 2MB

Somme de deux vecteurs

Série 1

1 L'image du point A par la translation de vecteur \vec{u} suivie de la translation de vecteur \vec{v} est le point ...

- a. E b. F





2 L'image du point A par la translation de vecteur \vec{u} suivie de la translation de vecteur \vec{v} est le point ...

- a. D b. E
 c. F d. G

3 L'image du carré rouge par la translation de vecteur \vec{u} suivie de la translation de vecteur \vec{v} est le carré numéro ...

- a. ① b. ②
 c. ③ d. ④



4 La translation de vecteur \vec{u} suivie de la translation de vecteur \vec{v} équivaut à la translation de vecteur ...

- a. \vec{x} b. \vec{y}

- c. \vec{t} d. \vec{w}

5 La translation de vecteur \vec{u} suivie de la translation de vecteur \vec{v} équivaut à la translation de vecteur ...

- a. $\vec{0}$ b. \vec{t}


- c. \vec{x} d. \vec{y}

Série 2

1 ABCD est un parallélogramme. Alors la somme des vecteurs \vec{DA} et \vec{DC} est égale au vecteur ...


- a. \vec{AC} b. \vec{CA}

- c. \vec{DB} d. \vec{BD}




2 La somme des vecteurs \vec{u} et \vec{v} est égale au vecteur ...

- a. \vec{t} b. \vec{x}
 c. \vec{y} d. \vec{w}



3 La somme des vecteurs \vec{u} , \vec{v} et \vec{w} est le vecteur ...


- a. $\vec{0}$ b. \vec{u}
 c. \vec{v} d. \vec{w}



4 A, B et C sont trois points distincts du plan. Alors on peut affirmer ...

- a. $\vec{BA} + \vec{CB} = \vec{AC}$
 c. $\vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$

- b. $\vec{BA} + \vec{AC} = \vec{AC}$
 d. $\vec{AB} + \vec{CB} = \vec{AC}$



5 ABCD est un parallélogramme de centre O. L'égalité vraie est ...

- a. $\vec{OB} + \vec{OD} = \vec{BD}$
 c. $\vec{DO} + \vec{OC} = \vec{CD}$

- b. $\vec{OB} + \vec{CD} = \vec{AO}$
 d. $\vec{OB} + \vec{BC} = \vec{AO}$

Série 3

1 Le plan est muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$. On donne les vecteurs $\vec{u}(2; 3)$ et $\vec{v}(5; 6)$. Les coordonnées du vecteur $\vec{u} + \vec{v}$ sont ...

- a. (8; 8)
 c. (7; 9)

- b. (-3; -3)
 d. (10; 18)

2 Le plan est muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$. On donne les vecteurs $\vec{u}(-1; 0)$ et $\vec{v}(-3; 4)$. Les coordonnées du vecteur $\vec{u} + \vec{v}$ sont ...

- a. (3; -3)
 c. (2; -4)

- b. (-4; 0)
 d. (-4; 4)

3 Le plan est muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$. On donne le vecteur $\vec{u}(7; 2)$. Les coordonnées du vecteur $\vec{u} + \vec{v}$ sont (8; 3). Alors les coordonnées du vecteur \vec{v} sont ...

- a. (1; 1)
 c. (-1; -1)

- b. (15; 5)
 d. (1; -1)

4 Le plan est muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$. On donne les vecteurs $\vec{u}(0; 1)$, $\vec{v}(-1; 3)$ et $\vec{w}(-5; -7)$. Les coordonnées du vecteur $\vec{u} + \vec{v} + \vec{w}$ sont ...


- a. (4; -3)
 c. (-1; 4)

- b. (0; -21)
 d. (-6; -3)

5 Le plan est muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$. Les coordonnées du vecteur $\vec{u} + \vec{v}$ sont ...

- a. (-6; 6)
 c. (2; 3)


- b. (-1; 5)
 d. (-3; 2)



Série 1


1 On donne le vecteur \vec{u} . Ci-contre, parmi les quatre vecteurs \vec{x} , \vec{y} , \vec{v} , \vec{w} , un seul peut s'écrire sous la forme $\lambda\vec{u}$ ($\lambda \in \mathbb{R}$). Il s'agit du vecteur ...

- a. \vec{v} b. \vec{w} c. \vec{x} d. \vec{y}




2 On donne le vecteur \vec{u} . Ci-contre, le seul vecteur qui peut s'écrire sous la forme $\lambda\vec{u}$ ($\lambda \in \mathbb{R}$) est le vecteur ...

- a. \vec{v} b. \vec{w} c. \vec{x} d. \vec{y}




3 On donne ci-contre les deux vecteurs \vec{u} et \vec{v} .
On peut affirmer ...

- a. $\vec{v} = 4\vec{u}$ b. $\vec{v} = -3\vec{u}$ c. $\vec{v} = -4\vec{u}$ d. $\vec{u} = -\frac{1}{3}\vec{v}$




4 On donne ci-contre les deux vecteurs \vec{u} et \vec{v} . L'égalité correcte est ...

- a. $\vec{v} = \vec{u} + 1$ b. $\vec{u} = -\vec{v}$ c. $\vec{u} = \frac{2}{3}\vec{v}$ d. $\vec{u} = \frac{3}{2}\vec{v}$



5 On donne ci-contre les deux vecteurs \vec{u} et \vec{v} . L'égalité correcte est ...


- a. $\vec{u} = \frac{4}{7}\vec{v}$ b. $\vec{u} = \frac{7}{4}\vec{v}$ c. $\vec{u} = -\frac{7}{4}\vec{v}$ d. $\vec{u} = -\frac{4}{7}\vec{v}$



Série 2


1 Ci-contre, on donne le vecteur \vec{u} . Le vecteur $2\vec{u}$ est le vecteur ...

- a. \vec{v} b. \vec{w} c. \vec{x} d. \vec{y}




2 Ci-contre, on donne le vecteur \vec{u} . Le vecteur $-\frac{1}{3}\vec{u}$ est le vecteur ...

- a. \vec{v} b. \vec{w} c. \vec{x} d. \vec{y}



3 On donne le vecteur \vec{u} . L'extrémité du représentant d'origine A du vecteur $-3\vec{u}$ est le point ...


- a. B b. C c. E d. un autre point que B, C, E



4 Ci-contre, les points A, B, C, D et E sont alignés.

Un vecteur égal à $-0,5\vec{AB}$ est le vecteur ...

- a. \vec{AE} b. \vec{BC} c. \vec{DB} d. \vec{DC}



5 Ci-contre, les points A, B, C, D et E sont alignés. Un vecteur égal à $\frac{2}{3}\vec{BC}$ est le vecteur ...

- a. \vec{AE} b. \vec{AB} c. \vec{DB} d. \vec{DC}

Série 3

1 Le plan est muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$. \vec{u} est le vecteur de coordonnées $(1; 2)$.

Les coordonnées du vecteur $3\vec{u}$ sont ...

- a. $(1; 6)$ b. $(3; 2)$ c. $(3; 6)$ d. $(4; 5)$

2 Le plan est muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$. \vec{u} est le vecteur de coordonnées $(-3; 4)$.

Les coordonnées du vecteur $-2\vec{u}$ sont ...

- a. $(6; 4)$ b. $(6; -8)$ c. $(-5; 2)$ d. $(-6; 8)$

3 Le plan est muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$. \vec{u} est le vecteur de coordonnées $(6; -12)$.

Les coordonnées du vecteur $\frac{3}{2}\vec{u}$ sont ...

- a. $(4; -8)$ b. $(18; -36)$ c. $(3; -6)$ d. $(9; -18)$

4 Le plan est muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$. On donne le vecteur $\vec{u} = -2\vec{i} + 4\vec{j}$.

Les coordonnées du vecteur $-\frac{1}{2}\vec{u}$ sont ...

- a. $(1; -2)$ b. $(-1; 2)$ c. $(2; -1)$ d. $(-2; 1)$

5 Le plan est muni d'un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$. On donne les vecteurs $\vec{u}(1; 0)$ et $\vec{v}(1; 3)$.

Les coordonnées du vecteur $\vec{u} + 3\vec{v}$ sont ...


- a. $(2; 3)$ b. $(4; 3)$ c. $(4; 9)$ d. $(6; 9)$

Série 1




1 Sur cette figure, les vecteurs \vec{u} et \vec{v} sont colinéaires car ...

- a. $\vec{v} = 2\vec{u}$ b. $\vec{v} = -2\vec{u}$
 c. $\vec{u} = -2\vec{v}$ d. $\vec{u} = 2\vec{v}$



2 Sur cette figure, les vecteurs \vec{u} et \vec{v} sont colinéaires car ...

- a. $\vec{v} = \frac{2}{3}\vec{u}$
 b. $\vec{v} = -\frac{2}{3}\vec{u}$
 c. $\vec{v} = \frac{3}{2}\vec{u}$
 d. $\vec{v} = -\frac{3}{2}\vec{u}$



3 A, B et C sont trois points tels que $\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC} = \vec{0}$. Les vecteurs \overrightarrow{AB} et \overrightarrow{AC} sont colinéaires car ...

- a. $\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{AC}$ b. $\overrightarrow{AC} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$
 c. $\overrightarrow{AC} = -2\overrightarrow{AB}$ d. $\overrightarrow{AB} = -2\overrightarrow{AC}$

4 A, B et C sont trois points tels que $5\overrightarrow{AB} - 3\overrightarrow{AC} = \vec{0}$. Les vecteurs \overrightarrow{AB} et \overrightarrow{AC} sont colinéaires car ...

- a. $\overrightarrow{AB} = \frac{3}{5}\overrightarrow{AC}$ b. $\overrightarrow{AB} = -\frac{3}{5}\overrightarrow{AC}$
 c. $\overrightarrow{AB} = \frac{5}{3}\overrightarrow{AC}$ d. $\overrightarrow{AB} = -\frac{5}{3}\overrightarrow{AC}$

5 A, B et C sont trois points tels que $\overrightarrow{AC} + 2\overrightarrow{BC} = \vec{0}$. Les vecteurs \overrightarrow{AB} et \overrightarrow{BC} sont colinéaires car ...

- a. $\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{BC}$ b. $\overrightarrow{AB} = -2\overrightarrow{BC}$
 c. $\overrightarrow{AB} = -3\overrightarrow{BC}$ d. $\overrightarrow{AB} = 3\overrightarrow{BC}$

Série 2



1 Le plan est muni d'un repère. On donne les coordonnées de quatre vecteurs : $\vec{u}(1; 2)$, $\vec{v}(2; 3)$, $\vec{w}(3; 5)$ et $\vec{x}(2; 4)$. Alors les vecteurs ...

- a. \vec{u} et \vec{v} sont colinéaires
 b. \vec{u} et \vec{w} sont colinéaires
 c. \vec{u} et \vec{x} sont colinéaires
 d. \vec{w} et \vec{v} sont colinéaires

2 Le plan est muni d'un repère. On donne quatre vecteurs : $\vec{u}(-3; 0)$, $\vec{v}(2; -3)$, $\vec{w}(-10; 15)$ et $\vec{x}(0; 4)$. Alors les vecteurs ...

- a. \vec{u} et \vec{w} sont colinéaires
 b. \vec{u} et \vec{x} sont colinéaires
 c. \vec{v} et \vec{w} sont colinéaires
 d. \vec{x} et \vec{w} sont colinéaires

3 Le plan est muni d'un repère. \vec{u} est le vecteur de coordonnées $(12; -7)$. Parmi les vecteurs $\vec{v}(0; -7)$, $\vec{w}(12; 0)$, $\vec{x}\left(-1; \frac{12}{7}\right)$ et $\vec{z}\left(1; -\frac{7}{12}\right)$, celui qui est colinéaire au vecteur \vec{u} est le vecteur ...

- a. \vec{v} b. \vec{w} c. \vec{x} d. \vec{z}

4 Le plan est muni d'un repère. \vec{u} est le vecteur de coordonnées $(2; -1)$. Parmi les vecteurs $\vec{v}(6; -3)$, $\vec{w}(1; -0,5)$, $\vec{x}(-1; -0,5)$ et $\vec{z}(-4; 2)$, celui qui n'est pas colinéaire au vecteur \vec{u} est le vecteur ...

- a. \vec{v} b. \vec{w} c. \vec{x} d. \vec{z}

5 Le plan est muni d'un repère. \vec{u} est le vecteur de coordonnées $(\sqrt{2}; 4)$. Parmi les vecteurs $\vec{v}(2; 16)$, $\vec{w}(2; 4\sqrt{2})$, $\vec{x}(-1; \sqrt{2})$ et $\vec{z}(2; 4)$, celui qui est colinéaire au vecteur \vec{u} est le vecteur ...

- a. \vec{v} b. \vec{w} c. \vec{x} d. \vec{z}

Série 3



1 Le plan est muni d'un repère. Le déterminant du vecteur $\vec{u}(10; 2)$ et du vecteur $\vec{v}(15; 3)$ est égal à ...

- a. 0 b. 30 c. 60 d. 144

2 Le plan est muni d'un repère. On donne les points A($-1; 3$) et B($2; 6$) et le vecteur $\vec{u}(2; 4)$. Le déterminant du vecteur \overrightarrow{AB} et du vecteur \vec{u} est égal à ...

- a. -6 b. 0 c. 6 d. 18

3 Le plan est muni d'un repère. On donne les vecteurs $\vec{u}(-2; 6)$ et $\vec{v}(1; -3)$. Les vecteurs \vec{u} et \vec{v} sont colinéaires car leur déterminant est ...

- a. égal à 0
 b. différent de 0
 c. égal à 1
 d. égal à -1

4 Le plan est muni d'un repère. On donne les vecteurs $\overrightarrow{AB}(2; 3)$ et $\overrightarrow{AC}(6; b)$. La valeur de b pour laquelle les points A, B et C sont alignés est ...

- a. 3 b. 9 c. -9 d. 18

5 Le plan est muni d'un repère. On donne les vecteurs $\overrightarrow{AB}(7; -2)$ et $\overrightarrow{CD}(a; 4)$. La valeur de a pour laquelle les droites (AB) et (CD) sont parallèles est ...

- a. 0 b. 14 c. -14 d. 28